

Het verloop van de beugel (“orthodontische”) behandeling

Eerste consult

Bij het eerste consult kijken we naar uw gebit, de kaken en het gezicht. We vragen of u tevreden bent met uw huidige gebitssituatie, naar uw verwachtingen en wensen.

Vervolgens zullen we in grote lijnen de mogelijkheden van de beugelbehandeling (orthodontische behandeling) met u bespreken.

De conclusie van het eerste consult kan zijn dat behandelen (nog) geen zin heeft. Wanneer een behandeling wel gewenst is, krijgt u een begroting, informatie over de besproken beugelbehandeling en een akkoordverklaring over de te starten behandeling mee.

Als u akkoord gaat met de behandeling, maken we vervolgafspraken voor uitgebreid aanvullend onderzoek en het plaatsen van de beugel.

Uitgebreid onderzoek

Tijdens het eerste consult hebben we al een indruk gekregen van de staat van uw gebit. Maar om een gedetailleerd behandelplan te maken, is uitgebreid aanvullend onderzoek nodig. We bekijken uw gezicht en gebit uitgebreid, vragen naar eventuele tandheelkundige of medische geschiedenis, nemen verschillende foto's (“gewone” en röntgenfoto's) en maken een afdruk van uw gebit.

Vervolgens stellen we een gedetailleerd persoonlijk behandelplan op. Hierin beschrijven we welke technische stappen en materialen nodig zijn om het gebit te reguleren, om het 'in vorm' te krijgen. Mochten hierbij nieuwe dingen aan het licht komen, dan zullen we dit met u bespreken.

Behandeling scheve tanden

Enkele weken later zal de beugel geplaatst worden. De behandeling kan uit verschillende soorten beugels bestaan.

Bij kinderen is het soms nodig eerst de boven- en onderkaak in de juiste positie te brengen of om de bovenkaak te verbreden. Dit doen we bijvoorbeeld door een losse, uitneembare beugel te plaatsen. Om de scheve tanden en kiezen recht te zetten gebruiken we meestal een vaste beugel. Deze duwt of trekt de tanden en kiezen naar de juiste positie.

Op het andere formulier vindt u meer informatie over het soort beugel en de beugelbehandeling die met u is besproken.

Nazorg: beugel verwijderen en retentie

Als de tanden, kiezen en/of kaken in de gewenste positie staan, kunnen we de beugelbehandeling beëindigen. Een vaste beugel wordt verwijderd en meestal bouwen we het dragen van een uitneembare beugel af.

Omdat de tanden, kiezen en/of kaken op de juiste positie moeten blijven staan, is het na een vaste beugel vaak nodig om het gebit hierin te ondersteunen met een retentiebeugel en/of –spalk.